

Số: /TTBVTV-BVTV
V/v Hướng dẫn phòng trừ Ốc sên
phát sinh gây hại trên cây trồng

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế thành phố, Nông nghiệp và PTNT các huyện;
- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố.

Trong điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay và qua kết quả kiểm tra thực tế đồng ruộng của cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) về tình hình sản xuất cây trồng.

Hiện nay, xuất hiện Ốc sên (*Achatina fulica*) gây hại trên cây cối và hoa màu, ốc cắn phá các bộ phận non, mềm của cây như: cành non, hoa và trái làm giảm năng suất, ảnh hưởng đến mẫu mã và giảm giá trị thương phẩm. Ốc sên phát sinh và gây hại mạnh vào mùa mưa trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ dưới 30°C. Ở Ninh Thuận, ốc sên thường gây hại nặng vào thời điểm vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia, cao điểm mùa mưa bão năm nay ở Trung bộ là tháng 10, tháng 11 và có thể kéo dài đến tháng 12. Do đó, trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa vừa đến mưa to trên địa bàn tỉnh, đây là điều kiện thích hợp cho ốc sên phát sinh và gây hại mạnh.

Để kịp thời ngăn chặn và chủ động phòng trừ, giảm tác hại do Ốc sên gây ra trên các loại cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị các địa phương cử cán bộ nông nghiệp, Công tác viên Bảo vệ thực vật cơ sở phối hợp Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố tăng cường công tác điều tra, phát hiện để phòng trừ Ốc sên hiệu quả. Trong trường hợp phát hiện Ốc sên gây hại trên các loại cây trồng, đặc biệt trên cây Măng tây, cây ăn quả (*bưởi, nho, táo, ...*) cần hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng trừ sau:

1. Vệ sinh vườn trồng: Dọn sạch cỏ dại, phát quang bờ ranh, cắt tỉa cành già, cành vô hiệu tạo độ thông thoáng để hạn chế nơi trú ẩn của ốc.
2. Biện pháp sinh học: Thả vịt vào vườn với mật số 10 con/ha để quản lý ốc.
3. Sử dụng vôi bột: Rải vôi bột lên mặt đất xung quanh gốc cây vào buổi chiều tối.
4. Sử dụng bả diệt ốc: Sử dụng trái cây hư cắt mỏng, cám ướt,... trộn với thuốc diệt ốc rải tại những nơi ốc trú ẩn vào buổi chiều mát, gần tối nhằm thu hút ốc sên tập trung để thu gom tiêu hủy.

Nơi có mật số Ốc sên cao, khuyến cáo nông dân sử dụng các hoạt chất trừ ốc sau: Metaldehyde (*Helix 500WP, Moioc 12AB, Milax 100GB, Osbuvang 15GR, 80WP, Toxbait 120AB, Yellow-K 12GB, 250SC, ...*), Niclosamide (*Kit - super*

700WP, Tanthanh-oc 760WP, Dobay 810WP,...), Saponin (Dibonin super 15WP, Abuna 15GR, Ốc tiêu 15 GR,...).

Lưu ý:

- Khi sử dụng bả mối, nên chia làm 2-3 đợt để tiêu diệt số lượng ốc còn lại trên vườn.

- Có thể kết hợp nhiều cách trên cùng một lúc để tăng khả năng phòng trừ Ốc sên hiệu quả.

Trên đây là một số nội dung quản lý Ốc sên gây hại trên cây trồng, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và cộng tác viên BVTV cơ sở, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng ruộng, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, cần phản hồi về Chi cục Trồng trọt và BVTV để có hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, BVTV.

CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Dũng